

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 18 - 6 - 80631422

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DÔME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

ABONNEMENT ANNUEL :

60,00 F

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux

Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN N° 151 du 28 MAI 1980

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE - (pommiers - poiriers)

Les risques de contaminations demeurent toujours très importants, il est conseillé de renouveler la protection avant le 1er Juin.

OIDIUM - (pommiers)

La lutte contre cette maladie ne doit pas être négligée.

ARAIGNEE ROUGE (*Panonychus ulmi*)

Si un traitement n'a pas été effectué suivant les indications données dans le bulletin N° 149 du 14 Mai, il y a lieu d'intervenir, la présence de ces ravageurs étant notée dans de nombreux vergers.

MINEUSES DES FEUILLES (région de SAINT-SANDOUX - Puy-de-Dôme)

Les premières pontes sont déposées sur feuilles depuis quelques jours. Il est conseillé d'effectuer un traitement dès la fin du mois de Mai.

Si de nombreux produits sont efficaces, il est toutefois recommandé d'utiliser le diflubenzuron (DIMILIN), en raison de son action ovicide, de sa très longue rémanence et de son absence de nuisibilité vis-à-vis des insectes auxiliaires.

GRANDES CULTURES

CEREALES

ORGE D'HIVER

Dans la majorité des situations, une intervention ne s'avère plus nécessaire en raison du stade avancé de cette céréale.

BLE D'HIVER

- Oïdium

Cette maladie présente à la base du feuillage, dans de nombreuses parcelles, a progressé sur les dernières feuilles (blé HARDI) dans les zones situées, en particulier, dans la proche vallée de l'Allier (région de SAINT-GERMAIN-LEMBRON - Puy-de-Dôme).

Dans ces situations, un traitement s'avère nécessaire avant épiaison.

- Septoriose

Cette maladie voit son développement favorisé par les nombreuses pluies d'orages, il est nécessaire de surveiller attentivement les parcelles jusqu'à fin épiaison.

- Rouille Jaune

Le premier foyer a été observé sur blé TALENT dans le département de l'Allier (LE MONTET).

A ce jour, cette maladie n'a pas été notée dans d'autres régions, toutefois, une surveillance particulière des blés s'impose à la suite de la période pluvieuse que nous traversons.

LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION

PHYTOSANITAIRE,

A. FARGEIX